

検査センター

トピックス

第 83 号 H28.12

糖尿病の診断がついたら・・・1 型と 2 型の鑑別に

抗 G A D 抗体測定を！

抗 GAD 抗体とは

自己免疫性の 1 型糖尿病患者の血中より
検出される自己抗体すでに糖尿病の診断が確定した患者に対しての 1 型糖尿病の診断
や、自己免疫介在性脳炎・脳症の診断に適応します。

測定のタイミング

糖尿病初回診断時と治療中に 血糖のコントロールが急激に悪化した時、C ペプチドが低下した時、また、他の自己免疫疾患（甲状腺疾患など）の合併症を併発した時など

適応疾患

- ☞ 1 型糖尿病
- ☞ 糖尿病
- ☞ 自己免疫疾患

カルテ記載
コメント例

- ☞ 1 型糖尿病の疑い
- ☞ 急な血糖コントロールの悪化があり、2 型糖尿病から 1 型糖尿病への転化の可能性も否定できず検査を行った

検査項目名	実施料《判断料》	検査材料	基準値 U / m L	所要日数	料金
抗 G A D 抗体	134 点 (D008 15) 《生Ⅱ》	血清 0.3mL	5.0 未満	3～5 日	872 円

ご不明な点はお問い合わせ下さい

呉市医師会臨床検査センター
TEL : 0823-25-7755